

КОМБИНИРОВАННЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

БАКТОПРИМ-

КОНЦЕНТРАТ



- Оральная форма – может применяться индивидуально или групповым способом
- Медленное развитие резистентности благодаря триметоприму
- Синергизм антибиотиков системного и несистемного действия
- Обладает отхаркивающим действием

НОВИНКА

Антибактериальный и муколитический эффект



Упаковка с застежкой зип-лок



1 кг



Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения

КОМБИНИРОВАННЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

БАКТОПРИМ-

КОНЦЕНТРАТ



СОСТАВ В 1 г содержится: сульфадимидин – 0,175 г, тилозина тартрат – 0,05 г, триметоприм – 0,035 г, бромгексина гидрохлорид – 0,01 г, колистина сульфат – 300 000 МЕ.

ТИЛОЗИНА
ТАРТРАТ

Оказывает
бактериостатическое
действие

КОЛИСТИНА
СУЛЬФАТ

Оказывает
бактерицидное
действие

СУЛЬФАДИМИДИН
И ТРИМЕТОПРИМ

Нарушают синтез
фолиевой кислоты
у микроорганизмов

БРОМГЕКСИНА
ГИДРОХЛОРИД

Оказывает отхаркивающее,
муколитическое
и иммуномодулирующее
действие

ПОКАЗАНИЯ

Препарат применяют для лечения молодняка крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птицы при болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, вызванных возбудителями, чувствительными к препарату; микоплазмозах, бактериальных осложнениях вирусных болезней.

Препарат активен против грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Klebsiella* spp., *Corynebacterium* spp., *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp.), а также в отношении микоплазм.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют орально с кормом или водой:

- молодняку крупного и мелкого рогатого скота – 1 г/10 кг живой массы с кормом или 1,5 кг/1000 кг корма или с водой 1-2 раза в день в течение 3-5 дней;
- свиньям – 1 г/10 кг живой массы с кормом или 1,5 кг/1000 кг корма или с водой 1-2 раза в день в течение 3-5 дней;
- птице – 1 кг/1000 л воды или 1,5 кг/1000 кг корма в течение 3-5 дней.

В период лечения животные должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ

Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 8 суток после последнего применения препарата. В случае убоя животных и птицы ранее указанного срока мясо можно использовать в корм плотоядным животным.

Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения

